EN

Precautions:

1. Due to discomfort or sensitivity that can occur as a result of your orthodontic treatment, avoid using this product for the first two weeks after receiving your orthodontic aligners and for the first two days after each new aligner set, as whitening can increase tooth sensitivity.
2. Limit contact with soft tissue.
3. Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.
4. If you have any questions regarding this product, please consult your dental professional.
5. Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
6. Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
7. Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
8. For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
9. Restorative materials will not whiten.
10. Inform your dentist that you have been whitening prior to any dental procedure.
11. Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
12. Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
13. White spots on the enamel may become more apparent during the whitening process and often blend with continued whitening.
14. Teeth can re-stain over time, do touch up teeth whitening treatments as necessary.
15. Avoid contact with eyes.
16. To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
17. Monitor progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.

ES

Precauciones:

1. Debido a las molestias o sensibilidad que pueden producirse como resultado de su tratamiento de ortodoncia, evite usar este producto las primeras dos semanas tras recibir sus alineadores ortodónticos y durante los dos primeros días tras colocar cada nuevo alineador, ya que el blanqueamiento puede aumentar la sensibilidad de los dientes.
2. Limite el contacto con el tejido blando.
3. Algunos empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en su cubeta de blanqueamiento; esto es normal.
4. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, consulte con su dentista.
5. Algunos pacientes pueden notar molestias temporales en las encías, labios, garganta, lengua o dientes. Si estos síntomas persisten o empeoran tras dejar de usar el producto, o en caso de molestias graves, llame a su dentista.
6. No coma, beba o fume mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.
7. Evite ingerir grandes cantidades de gel. La ingestión de pequeñas cantidades de gel durante el uso es normal.
8. Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.
9. Los materiales restauradores no se blanquearán.
10. Informe a su dentista de que está realizando un procedimiento de blanqueamiento antes de cualquier procedimiento dental.
11. Los pacientes con problemas de salud graves, deberían consultar con su médico de cabecera antes de realizar el tratamiento.
12. Las mujeres embarazadas o lactantes no deberían usar productos de blanqueamiento dental.
13. Las manchas blancas en el esmalte pueden volverse más aparentes durante el proceso de blanqueamiento y a menudo desaparecerán con el blanqueamiento continuado.
14. Los dientes pueden volver a mancharse con el tiempo; realice tratamientos de blanqueamiento de dientes de retoque según sea necesario.
15. Evite contacto con los ojos.
16. Para evitar irritaciones adicionales, debe evaluarse la salud gingival y bucal en general antes de iniciar el tratamiento.
17. Monitorice el progreso para evitar un blanqueamiento más allá del tono o translucencia deseados.

DE

Vorsichtsmaßnahmen

Da Beschwerden oder Empfindlichkeit als Ergebnis der kieferorthopädischen Behandlung auftreten können, vermeiden Sie den Einsatz dieses Produkts in den ersten zwei Wochen nach Erhalt Ihrer kieferorthopädischen Aligner-Schienen, und in den ersten zwei Tagen nach jedem neuen Aligner-Zahnschienenset, da eine Zahnweißung die Empfindlichkeit der Zähne erhöhen kann.
2. Kontakt mit Weichteilen zeitlich begrenzen.
3. Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe an der Zahnweißungsschiene hinterlassen. Das ist normal.
4. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
5. Einige Patienten können vorübergehende Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum, Zunge oder an den Zähnen erleiden. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, falls die Symptome nach Absetzen der Verwendung weiterhin anhalten oder bei Fällen, in denen schwerwiegende Beschwerden vorliegen.
6. Nicht essen, trinken oder Tabakprodukte konsumieren, solange die Zahnweißungsschienen in Position eingesetzt sind.
7. Das Verschlucken großer Mengen Gel vermeiden. Die Einnahme kleiner Mengen Gel während der Verwendung wird erwartet.
8. Informationen zu Patienten oder Benutzer mit Verdacht auf Allergien finden Sie im allgemeinen Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.
9. Restaurativmaterialien lassen sich nicht aufhellen.
10. Informieren Sie Ihren Zahnarzt vor einer Zahnbehandlung, dass bei Ihnen eine Zahnweißung durchgeführt wurde.
11. Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sollten vor der Behandlung ihren medizinischen Erstversorger befragen.
12. Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Zahnweißungsprodukte verwenden.
13. Während des Zahnweißungsvorgangs erscheinen die weißen Flecken auf dem Zahnschmelz auffälliger und können sich bei fortgesetzter Zahnweißung vermischen.
14. Zähne können sich im Lauf der Zeit erneut verfärben. Lassen Sie deshalb gegebenenfalls die Zahnweißungsbehandlung nachbessern.
15. Kontakt mit den Augen vermeiden.
16. Gingivale und allgemeine orale Gesundheit sollte vor dem Beginn einer Behandlung beurteilt werden, um einer zusätzlichen Reizung vorzubeugen.
17. Den Fortschritt überwachen, um eine Zahnweißung über die gewünschte Schattierung hinaus zu verhindern.

PT

Precauções:

1. Devido ao desconforto ou sensibilidade que pode ocorrer como resultado do seu tratamento ortodôntico, evite usar esse produto durante as duas primeiras semanas após receber os seus alinhadores ortodônticos e durante os dois primeiros dias após cada novo conjunto de alinhadores, pois o branqueamento pode aumentar a sensibilidade dos dentes.
2. Limite o contacto com tecidos moles.
3. Algumas amálgamas de obturação podem deixar uma cor púrpura escura na moldeira branqueadora; isto é normal.
4. Se tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contacto com o seu dentista.
5. Alguns pacientes podem sentir desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta, língua ou dentes. Se algum destes sintomas persistir ou piorar após a interrupção da utilização, ou em casos de desconforto grave, contacte o seu dentista.
6. Não coma, não beba nem use produtos de tabaco enquanto as moldeiras branqueadoras estiverem no lugar.
7. Evite engolir grandes quantidades de gel. É esperada a ingestão de pequenas quantidades de gel durante a utilização.
8. Para doentes ou utilizadores com alergias, consulte o documento sobre alergénios do produto disponível em www.ultradent.com. Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área exposta com água e peça ao paciente que consulte o seu médico.
9. Os materiais restaurativos não serão branqueados.
10. Informe o seu dentista que tem feito um branqueamento antes de qualquer procedimento dentário.
11. Os pacientes com sérias preocupações de saúde devem consultar os seus médicos antes do tratamento.
12. Mulheres grávidas ou lactantes não devem usar produtos branqueadores dos dentes.
13. As manchas brancas no esmalte podem tornar-se mais aparentes durante o processo de branqueamento e muitas vezes misturam-se com o branqueamento contínuo.
14. Os dentes podem voltar a ficar manchados com o tempo, faça tratamentos de retoque de branqueamento dos dentes, conforme necessário.
15. Evite o contacto com os olhos.
16. Para evitar uma irritação adicional, deve se feita uma avaliação da saúde das gengivas e oral geral antes de iniciar o tratamento.
17. Controle o progresso para evitar o branqueamento para além da tonalidade ou translucidez desejada.

FR

Précautions:

1. En raison de l'inconfort ou de la sensibilité qui peuvent survenir à la suite de votre traitement orthodontique, évitez d'utiliser ce produit pendant les deux premières semaines après avoir reçu vos gouttières orthodontiques et pendant les deux premiers jours après chaque nouvel ensemble de gouttières, car le blanchiment peut augmenter la sensibilité dentaire.
2. Limiter le contact avec les tissus mous.
3. Certaines garnitures d'amalgame peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière de blanchiment ; c'est normal.
4. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez consulter votre dentiste.
5. Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort sévère, appelez votre dentiste.
6. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant que les gouttières de blanchiment sont en place.
7. Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
8. Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
9. Les matériaux de restauration ne blanchiront pas.
10. Informer votre dentiste que vous avez blanchi vos dents avant toute intervention dentaire.
11. Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur fournisseur de soins primaires avant le traitement.
12. Les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
13. Les taches blanches sur l'émail peuvent devenir plus apparentes pendant le processus de blanchiment et se mélanger par la suite avec un blanchiment continu.
14. Les dents peuvent se tacher au fil du temps, retoucher les traitements de blanchiment des dents si nécessaire.
15. Éviter tout contact du produit avec les yeux.
16. Pour éviter toute irritation supplémentaire, l'état de santé gingival et buccal doit être évalué avant de commencer le traitement.
17. Surveiller les progrès pour éviter de blanchir au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitées.

SV

Försiktighetsåtgärder:

1. Vid obehag eller känslighet efter din ortodontiska behandling ska du undvika att använda den här produkten de första två veckorna efter att du har fått dina bettskenor samt de två första dagarna efter mottagande av varje ny bettskena, eftersom blekning kan höja känsligheten i tänderna.
2. Undvik kontakt med mjukvävnad.
3. Vissa amalgamfyllningar kan efterlämna en mörklila färg på din blekningsskena, vilket är normalt.
4. Rådfråga din tandläkare om du har frågor om den här produkten.
5. Vissa patienter kan uppleva ett övergående obehag i tandkött, läppar, svalg, tunga eller tänder. Kontakta din tandläkare om något av dessa symtom skulle bestå eller förvärras efter avslutad behandling.
6. Du ska inte äta, dricka eller använda tobaksprodukter när du har blekningsskenan i munnen.
7. Undvik att svälja större mängder gel. Insugning av små mängder gel under användning är normalt.
8. Besök www.ultradent.com för att se dokument om produktallergener för patienter eller användare med allergier. Om en allergisk reaktion observeras ska du skölja det exponerade området med vatten och uppmana patienten att konsultera sin läkare.
9. Det går inte att bleka restaureringsmaterial.
10. Informera din tandläkare om att du har blekt dina tänder innan ni påbörjar någon behandling.
11. Patienter med allvarliga hälsoproblem bör konsultera sin primära vårdgivare före behandling.
12. Gravida eller ammande kvinnor bör inte använda tandblekningsprodukter.
13. Vita fläckar på emaljen kan bli mer framträdande under blekningsprocessen och sedan smälta in under fortsatt blekning.
14. Tänderna kan bli fläckiga igen, i vilket fall du kan förbättra resultatet med ytterligare blekning.
15 Undvik kontakt med ögon.
16. För att undvika ytterligare irritation bör du kontrollera att gingivan är frisk och att patienten har god allmän munhälsa före behandling.
17. Övervaka blekningsförloppet för att undvika blekning utöver önskad grad av blekning eller genomskinlighet.

NL

Voorzorgsmaatregelen

1. Wegens ongemak of gevoeligheid die kunnen optreden ten gevolge van uw orthodontische behandeling dient u dit product te vermijden gedurende de eerste twee weken na het krijgen van uw orthodontische beugel en gedurende de eerste twee dagen na elke nieuwe beugelset, omdat bleken kan leiden tot gevoeligere tanden.
2. Beperkt het contact met zachte weefsels.
3. Het kan zijn dat sommige amalgaamvullingen een donkerpaarse kleur achterlaten in uw bleekbeugel. Dit is normaal.
4. Als u vragen hebt over dit product, raadpleeg dan uw tandarts.
5. Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak ervaren aan het tandvlees, lippen, keel, tong of tanden. Als een van deze symptomen aanhoudt of erger wordt na het staken van het gebruik of in geval van ernstig ongemak, bel naar uw tandarts.
6. Eet, drink of gebruik geen tabak wanneer u de bleekbeugels in hebt.
7. Slik geen grote hoeveelheden gel in. Het is wel te verwachten dat er tijdens het gebruik kleine hoeveelheden gel ingeslikt worden.
8. Raadpleeg voor patiënten of gebruikers met allergieën het document over allergene producten op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patiënt zijn arts raadplegen.
9. Restaurerend materiaal zal niet bleken.
10. Informeer uw tandarts dat u uw tanden hebt gebleekt voor elke tandheelkundige procedure.
11. Patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun primaire gezondheidszorgverlener raadplegen vóór de behandeling.
12. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, mogen geen tandbleekproducten gebruiken.
13. Witte vlekken op het glazuur kunnen opvallender worden tijdens het bleekproces, maar deze vervagen na continu bleken vaak.
14. Er kunnen na verloop van tijd weer vlekken verschijnen op de tanden. Herhaal de bleekbehandelingen zoals nodig.
15. Vermijd contact met de ogen.
16. Om extra irritatie te vermijden moeten de gezondheid van het tandvlees en de mond vóór het begin van de behandeling beoordeeld worden.
17. Monitor de vooruitgang om te vermijden dat de tanden witter worden dan de gewenste tint of doorzichtigheid.

IT

Precauzioni:

1. A causa del disagio o della sensibilità che può verificarsi come conseguenza del proprio trattamento ortodontico, evitare di usare questo prodotto per le prime due settimane successive all'applicazione di allineatori e per i primi due giorni successivi a ogni nuovo set di allineatori, poiché lo sbiancamento può aumentare la sensibilità dentale.
2. Limitare il contatto con i tessuti molli.
3. Alcune otturazioni in amalgama possono lasciare un colore viola scuro sulla mascherina sbiancante, è normale.
4. In caso di domande riguardo a questo prodotto, consultare il proprio dentista.
5. Alcuni pazienti possono notare un disagio temporaneo a carico di gengive, labbra, gola, lingua o denti. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persista o peggiori successivamente all'uso intermittente, oppure in casi di grave disagio, contattare il proprio dentista.
6. Non mangiare, bere, o consumare prodotti del tabacco mentre le mascherine per il trattamento sbiancante sono in posizione.
7. Evitare di ingerire grandi quantità di gel. L'ingerimento di piccole quantità di gel durante l'uso è previsto.
8. Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni disponibile al sito www.ultradent.com. Se vengono riscontrare delle reazioni allergiche, lavare le aree esposte con molta acqua e far controllare il paziente da un medico.
9. I materiali per il restauro dentale non subiranno alcuno sbiancamento.
10. Informare il proprio dentista se ci si è sottoposti a sbiancamento, prima di subire qualsiasi procedura dentistica.
11. I pazienti con gravi problemi di salute devono contattare il proprio medico prima del trattamento.
12. Le donne incinte o in fase di allattamento non possono usare prodotti per lo sbiancamento dentale.
13. Le macchie bianche sullo smalto possono apparire più visibili durante il processo di sbiancamento, ma spesso si fondono con lo sbiancamento dentale.
14. I denti possono macchiarsi nuovamente nel tempo, quindi effettuare trattamenti di sbiancamento secondo necessità.
15. Evitare il contatto con gli occhi.
16. Per impedire l'irritazione, è necessario valutare la salute gengivale e orale globale prima di iniziare il trattamento.
17. Monitorare il progresso dello sbiancamento per evitare uno sbiancamento o un grado di traslucenza oltre il livello desiderato.

EL

Προφυλάξεις:

1. Λόγω δυσφορίας ή ευαισθησίας που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της ορθοδοντικής σας θεραπείας, αποφύγετε τη χρήση αυτού του προϊόντος για τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά τη λήψη των ορθοδοντικών σας ναρθηκών, και κατά τις δύο πρώτες ημέρες μετά από κάθε νέο σετ ναρθηκών, καθώς η λεύκανση μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία των δοντιών.
2. Περιορίστε την επαφή με μαλακό λεπτό ύφασμα.
3. Ορισμένα σφραγίσματα αμαλγάματος ενδέχεται να αφήσουν ένα σκούρο μωβ χρώμα στον δίσκο λεύκανσης. Αυτό είναι φυσιολογικό.
4. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το προϊόν, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
5. Μερικοί ασθενείς ενδέχεται να νιώσουν προσωρινή δυσφορία στα ούλα, τα χείλη, τον λαιμό, τη γλώσσα ή τα δόντια. Εάν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επιμείνει ή επιδεινωθεί μετά τη διακοπή της χρήσης, ή σε περιπτώσεις μεγάλης δυσφορίας, καλέστε τον οδοντιάτρό σας.
6. Μην τρώτε, πίνετε και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καπνίσματος ενώ είναι τοποθετημένοι οι δίσκοι λεύκανσης.
7. Αποφύγετε την κατάποση μεγάλων ποσοτήτων γέλη. Η κατάποση μικρών ποσοτήτων γέλη κατά τη χρήση είναι αναμενόμενη.
8. Για ασθενείς ή χρήστες με αυξημένες για αλλεργίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση αλλεργιογόνων του προϊόντος στη διεύθυνση www.ultradent.com. Εάν παρατηρήσετε αλλεργική αντίδραση, ξεπλύνετε την εκτεθειμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί το γιατρό του.
9. Τα υλικά αποκατάστασης δεν θα λευκανθούν.
10. Ενημερώστε τον οδοντιάτρό σας ότι έχετε κάνει λεύκανση πριν από οποιαδήποτε οδοντιατρική διαδικασία.
11. Οι ασθενείς με σοβαρές ανησυχίες για την υγεία τους πρέπει να συμβουλευτούν τον πάροχο πρωτοβάθμιας περίθαλψης πριν από τη θεραπεία.
12. Οι έγκυες ή οι θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα λεύκανσης δοντιών.
13. Οι λευκές κηλίδες στο σμάλτο ενδέχεται να γίνουν πιο εμφανείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λεύκανσης και συχνά συγχωνεύονται με τη συνεχιζόμενη λεύκανση.
14. Τα δόντια μπορούν να λεκιάσουν ξανά με την πάροδο του χρόνου, κάντε επαναληπτικές θεραπείες λεύκανσης των δοντιών, αν χρειαστεί.
15. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
16. Για την αποφυγή επιπλέον ερεθισμού, πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας η υγεία των ούλων και η γενική στοματική υγεία.
17. Παρακολουθήστε την πρόοδο για να αποφύγετε τη λεύκανση πέρα από την επιθυμητή απόχρωση ή βαθμό διαύγειας.

NO

Forholdsregler:

1. På grunn av ubehag eller sensitivitet som kan oppstå som resultat av din tannguleringsbehandling bør du unngå å bruke dette produktet i de to første ukene etter at du har fått din justeringsskinne og i de to første dagene etter hvert nye justeringssett ettersom bleking kan øke tennenes følsomhet.
2. Begrens kontakt med mykt vev.
3. Noen amalgamfyllinger kan etterlate en mørk lilla farge i blekeskinnen din. Dette er normalt.
4. Kontakt din tannlege hvis du har spørsmål om dette produktet.
5. Noen pasienter kan oppleve midlertidig ubehag i tannkjøttet, leppene, halsen, tungen eller tennene. Kontakt din tannlege hvis noen av disse symptomene vedvarer eller blir verre, og hvis du opplever alvorlig ubehag.
6. Ikke spis, drikk eller bruk tobakksprodukter mens du har tannblekingsskinner i munnen.
7. Unngå å svelge store mengder gel. Svelging av små mengder gel under bruk er forventet.
8. For pasienter eller brukere med allergiproblemer, se produktallergendokumentet som du finner på www.ultradent.com. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, skyll det eksponerte området grundig med vann og få pasienten til å kontakte sin lege.
9. Materialer for gjenoppbygging vil ikke blekes.
10. Informer tannlegen din hvis du har brukt bleking før enhver tannbehandling.
11. Pasienter med alvorlige helseproblemer bør konsultere sin primære helsekontakt før behandling.
12. Gravide eller ammende kvinner bør ikke bruke produkter for tannbleking.
13. Hvite flekker på emaljen kan bli mer synlige under blekingsprosessen og kan ofte bli mer lik omgivelsene med fortsatt bleking.
14. Tenner kan få nye flekker med tiden så oppfrisking av tannbleking er nødvendig.
15. Unngå kontakt med øynene.
16. For å unngå ytterligere irritasjon, må tannkjøtt- og generell munnhelse evalueres før start av behandling.
17. Følg med på utviklingen for å forhindre bleking ut over ønsket nyanse eller gjennomskinnelighet.

PL

Środki ostrożności

1. Z powodu dyskomfortu lub nadwrażliwości, jakie mogą wystąpić w wyniku leczenia ortodontycznego należy unikać stosowania tego produktu w ciągu pierwszych dwóch tygodni po otrzymaniu nakładek ortodontycznych i przez pierwsze dwa dni po otrzymaniu każdego nowego zestawu nakładek wyrównujących, ponieważ wybielanie może nasilać wrażliwość zębów.
2. Ograniczyć kontakt z tkanką miękką.
3. Niektóre wypełnienia amalgamatowe mogą spowodować ciemnofioletowe zabarwienie nakładki wybielającej. Jest to zjawisko normalne.
4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze stomatologiem.
5. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć przemijający dyskomfort w okolicy dziąseł, ust, gardła, języka lub zębów. W razie utrzymywania lub pogorszenia się któregokolwiek z tych objawów po zaprzestaniu użytkowania lub w przypadku silnego dyskomfortu należy skontaktować się ze stomatologiem.
6. Po założeniu nakładek wybielających nie wolno jeść, pić ani używać wyrobów tytoniowych.
7. Unikać połykania dużych ilości żelu. Połknięcie niewielkich ilości żelu podczas użytkowania jest zgodne z przewidywaniami.
8. W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów w produkcie, dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej przepłukać dokładnie zanieczyszczony obszar wodą i skierować pacjenta na konsultację do lekarza prowadzącego.
9. Materiały do wypełnień nie ulegają wybielaniu.
10. Przed podaniem się jakiemukolwiek zabiegowi stomatologicznemu należy poinformować stomatologa o przebytym wybielaniu zębów.
11. Pacjenci z ciężkimi problemami natury zdrowotnej powinni skontaktować się z lekarzem POZ przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
12. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować produktów do wybielania zębów.
13. Białe plamy na szkliwie mogą pojawić się podczas procesu wybielania, ale często stapiają się z odcieniem szkliwa w toku dalszego wybielania.
14. Z upływem czasu na zębach ponownie mogą pojawić się przebarwienia. W razie konieczności zabiegi wybielania zębów należy powtarzać.
15. Unikać kontaktu z oczami.
16. Aby zapobiec dodatkowemu podrażnieniu, przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić stan dziąseł i ogólny stan jamy ustnej.
17. Monitorować postępy, aby zapobiec wybieleniu poza pożądany odcień lub przezierność.

CS

Bezpečnostní opatření:

1. Kvůli bolestem či citlivosti, která se může vyskytnout v důsledku ortodontického ošetření, tento produkt nepoužívejte po dobu dvou týdnů po po osazení rovnátek a dva dny po úpravách osazených rovnátek. Bělení totiž může zvýšit citlivost zubů.
2. Omezte kontakt s měkkými tkáněmi.
3. Některé amalgámové plomby mohou na bělicím nosiči zanechat fialové zbarvení, tento jev je běžný.
4. V případě jakýchkoli otázek k tomuto produktu se prosím obraťte na svého zubaře.
5. Někteří pacienti mohou pociťovat dočasné mírné bolesti dásní, rtů, hrdla, zubů a jazyka. Pokud některé z těchto příznaků přetrvají nebo se po přerušeném používání zhorší, případně pokud pociťujete vážné bolesti, zavolejte svému zubaři.
6. Nejezte, nepijte ani nekuřte tabákové výrobky s nasazenými bělicími nosiči.
7. Nepolykejte velké množství gelu. Během použití se předpokládá požití malého množství gelu.
8. Pacienti nebo uživatelé s obavami z alergií by si měli přečíst dokument o alergenech, které produkt obsahuje, dostupný na webu www.ultradent.com. Pokud se objeví alergická reakce, opláchněte exponovanou oblast vodou a poslete pacienta k lékaři.
9. Výplňové materiály nezbělují.
10. Před jakýmkoli zubním ošetřením svého zubaře informujte, že si bělíte zuby.
11. Pacienti s vážnými zdravotními problémy by se před léčbou měli poradit s praktickým lékařem.
12. Těhotné či kojící ženy by bělicí produkty neměly používat.
13. Bílé skvrny se mohou během procesu bělení zdát výraznější na sklovině a s postupem bělení mohou zaniknout.
14. Na zubech se mohou v průběhu času opět vytvořit skvrny. V případě potřeby proveďte dodatečné bělení.
15. Zabraňte kontaktu s očima.
16. Aby nedošlo k dalšímu podráždění, ověřte dobrý zdravotní stav dásní a ústní dutiny.
17. Sledujte pokrok, abyste zabránili bělení mimo požadovaný odstín či prosvítání zubů.

RU

Меры предосторожности:

1. Из-за дискомфорта или повышенной чувствительности зубов, которая может возникнуть в результате ортодонтического лечения, избегайте использования этого продукта в течение первых двух недель после получения ваших элайнеров, а также в течение первых двух дней после получения каждого нового набора элайнеров, поскольку отбеливание может повысить чувствительность зубов.
2. Избегайте контакта с мягкими тканями.
3. Некоторые наполнители из амальгамы могут оставлять темно-фиолетовый цвет в вашей отбеливающей капе; это нормально.
4. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого продукта, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим стоматологом.
5. Некоторые пациенты могут испытывать временный дискомфорт десен, губ, горла, языка или зубов. Если какой-либо из этих симптомов сохранится или ухудшится после прекращения использования, а также в случае сильного дискомфорта, обратитесь к своему стоматологу.
6. Не ешьте, не пейте и не используйте табачные изделия во время использования отбеливающих кап.
7. Избегайте проглатывания большого количества геля. Проглатывание небольшого количества геля во время использования является нормальным.
8. Для пациентов или пользователей, имеющих проблемы с аллергией, см. документы об аллергене продукта, доступные на сайте www.ultradent.com. Если наблюдается аллергическая реакция, тщательно промойте открытую область водой и попросите пациента проконсультироваться с врачом.
9. Реставрационные материалы не будут отбеливаться.
10. Сообщите своему стоматологу, что вы отбеливали зубы перед любой стоматологической процедурой.
11. Пациенты с серьезными проблемами со здоровьем должны проконсультироваться со своим лечащим врачом до начала лечения.
12. Беременные или кормящие женщины не должны использовать продукты для отбеливания зубов.
13. Сначала белые пятна на эмали могут казаться более заметными во время отбеливания и зачастую сочетаются с основным оттенком зубов во время продолжения отбеливания.
14. Со временем на зубах снова могут появляться пятна, при необходимости вновь проведите процедуру отбеливания зубов.
15. Не допускайте попадания в глаза.
16. Чтобы предотвратить дополнительное раздражение, стоматолог должен убедиться, что ваши десны и ротовая полость здоровы.
17. Следите за процессом, чтобы предотвратить отбеливание за пределами желаемого оттенка или прозрачности.

TR

Önlemler:

1. Ortodontik tedavi sonucu ortaya çıkabilecek rahatsızlık veya hassasiyet sebebiyle, ortodontik şeffaf plaklarınız takıldıktan sonra ve her yeni şeffaf plak setinden sonra bu ürünü kullanmaktan kaçının; beyazlatma işlemi diş hassasiyetini artırabilir.
2. Yumuşak dokuyla temasını sınırlandırın.
3. Bazı amalgam dolgular beyazlatma plağınızda koyu mor bir leke bırakabilir; bu durum normaldir.
4. Bu ürünle ilgili sorularınız varsa lütfen diş hekiminize danışın.
5. Bazı hastalar geçici diş eti, dudak, boğaz, dil veya diş hassasiyeti yaşayabilir. Bu semptomlardan herhangi birisi ürün bırakıldıktan sonra geçmezse ve kötüleşirse veya aşırı hassasiyet oluşursa diş hekiminize danışın.
6. Beyazlatma plakları ağzınızdayken yemek yemeyin, içecek içmeyin ve tütün ürünleri kullanmayın.
7. Çok miktarda jel yutmaktan kaçının. Kullanım sırasında az miktarda jel yutulması beklenir.
8. Alerji endişesi olan hastalar veya kullanıcılar için www.ultradent.com adresinde bulunan ürün alerjen belgesine bakın. Alerjik reaksiyon görülürse maruz kalan bölgeyi suyla iyice yıkayın ve hastaya doktora başvurmasını söyleyin.
9. Restoratif materyaller beyazlamaz.
10. Herhangi bir dental işlem yaptırmadan önce beyazlatma yaptırdığınızı diş hekiminize söyleyin.
11. Ciddi sağlık endişeleri olan hastalar, tedaviden önce aile hekimine danışmalıdır.
12. Hamile ve emziren kadınlar diş beyazlatma ürünlerini kullanmamalıdır.
13. Beyazlatma işlemi sırasında minedeki beyaz noktalar daha belirgin hale gelebilir ancak genellikle beyazlatmaya devam edilmesiyle kaybolur.
14. Dişler zaman içinde tekrar sararabilir; gerektiğinde rötuş beyazlatma işlemi yapılabilir.
15. Gözlerle temasından kaçının.
16. Daha fazla irritasyonu önlemek için tedaviye başlamadan önce diş eti ve genel ağız sağlığı değerlendirilmelidir.
17. İstenen tondan veya yarı saydamlıktan daha fazla beyazlatmayı önlemek için ilerlemeyi takip edin.

AR

الاحتياطات

1. تجنب استخدام هذا المنتج في أول أسبوعين بعد تلقي أدوات تقويم الأسنان وفي أول يومين بعد وضع كل أداة من أدوات التقويم الجديدة حتى لا تشعر بالارتجاج أو تعاني من الحساسية نتيجة علاج تقويم الأسنان، نظرًا لأنه قد يترتب على تبييض الأسنان زيادة حساسيتها.
2. قد تترك بعض الحشوات الملغمية لونًا أرجوانيًا داكنًا في طابع التبييض؛ هذا أمر طبيعي.
3. إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص هذا المنتج، يُرجى استشارة طبيب الأسنان القائم على حالتك.
4. قد يعاني بعض المرضى من انزعاج مؤقت في اللثة أو الشفتين أو الحلق أو اللسان أو الأسنان. في حالة استمرار أو تفاقم أي من هذه الأعراض بعد التوقف عن الاستخدام، أو في حالة الارتجاج الشديد، يتعين الاتصال بطبيب الأسنان.
5. لا تأكل أو تشرب أو تستخدم منتجات التبغ أثناء وضع طابعي التبييض.
6. تجنب ابتلاع كميات كبيرة من الجل. من المتوقع ابتلاع كميات صغيرة من الجل أثناء الاستخدام.
7. بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين يعانون من الحساسية، يُرجى الاطلاع على الوثيقة المتعلقة بالحساسية تجاه المنتج على www.ultradent.com. وإذا لوحظ وجود رد فعل تحسسي، فغسيل منطقة المكشوفة بأكملها بالماء وتوجيه المريض لاستشارة الطبيب.
8. لن تبيض المواد الترميمية.
9. أخبر طبيب أسنانك أنك كنت تخضع لإجراءات تبييض للأسنان قبل أي إجراء آخر يرتبط بالأسنان.
10. يجب على المرضى الذين يعانون من مخاوف صحية خطيرة استشارة مقدم الرعاية الأولية القائم على حالتهم قبل العلاج.
11. يحظر على النساء الحوامل أو المرضعات استخدام منتجات تبييض الأسنان.
12. قد تصبح البقع البيضاء على مينا الأسنان أكثر وضوحًا أثناء عملية التبييض، وغالبًا ما تمتزج مع التبييض المستمر.
13. قد تظهر البقع ثانية على الأسنان بمرور الوقت، وآنذاك يتعين عليك استخدام علاجات التنظيف بعد تبييض الأسنان حسب الضرورة.
14. تجنب ملامسة العين.
15. يجب تقييم صحة اللثة وصحة الفم العامة قبل بدء العلاج لمنع حدوث المزيد من التهيج.
16. عليك رصد التقدم المحرز لمنع التبييض خارج النطاق المحدد أو الشفافية المطلوبة.

TH

ข้อควรระวัง

1. เนื่องจาก อาการไม่สบายฯ หรืออาการเสียวฟันที่อาจเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันของคุณ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในช่วงสองสัปดาห์แรก หลังจาก ได้ใส่เครื่องมือจัดฟันของคุณและสำหรับสองวันแรก หลังจาก การเปลี่ยนชุดจัดฟันใหม่แต่ละชุด เนื่องจากการฟอกสีฟันสามารถเพิ่มอาการเสียวฟัน
2. จำกัดการสัมผัสถูกเนื้อเยื่ออ่อน
3. การอุดด้วยอะมัลกัมบางครั้งอาจทำให้เกิดสีม่วงเข้มในถาดฟอกสีฟันของคุณ นี่เป็นสิ่งปกติ
4. หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณ
5. ผู้ป่วยบางรายอาจมีความรู้สึกไม่สบายชั่วคราวที่เหงือก, ริมฝีปาก, ลำคอ, ลิ้นหรือฟัน หากอาการเหล่านี้ยังคงมีอยู่หรือแย่ลงหลังจากหยุดใช้งานหรือในกรณีที่รู้สึกไม่สบายอย่างรุนแรงให้โทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมของคุณ
6. อย่ากิน, ดื่มหรือใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในขณะที่ยังใส่ถาดฟอกสีฟันอยู่
7. หลีกเลี่ยงการกลืนเจลในปริมาณมากๆ อาจจะมีการกลืนกินเจลเล็กน้อยในระหว่างการใช้งาน
8. สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ใช้ที่มีความกังวลเรื่องอาการแพ้ โปรดดูเอกสารสารก่อภูมิแพ้ของผลิตภัณฑ์ที่ www.ultradent.com หากพบอาการแพ้ ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำอย่างทั่วถึง และให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์
9. วัสดุบูรณะจะไม่ฟอกขาว
10. แจ้งทันตแพทย์ของคุณว่าคุณได้รับการฟอกสีฟันก่อนขั้นตอนการทันตกรรมใด ๆ
11. ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ควรปรึกษาผู้ให้บ



EN	Express one continuous line of gel along the lower half of the cheek side of each aligner tray. Use ¼ to 1/3 of syringe per arch.	Lightly tap tray to adapt sides to teeth. Ensure that the trays are fully seated and completely engaged onto the aligner buttons. Wear Opalescence 10% gel for 8-10 hours over night.	Remove excess gel with soft toothbrush. Do not swallow rinsed gel.	Clean tray with soft brush and water.
DE	An jeder Aligner-Zahnschiene einen durchgehenden Gel-Strang entlang der unteren Hälfte der Wangenseite herausdrücken. ¼ bis 1/3 des Inhalts einer Injektionsspritze pro Zahnbogen verwenden.	Zahnschiene leicht antippen, um die Seiten an die Zähne anzupassen. Sorgen Sie dafür, dass die Zahnschienen vollständig eingesetzt und in den Knöpfen der Aligner-Schienen vollständig eingerastet sind. Über Nacht 10%iges Opalescence-Gel 8-10 Stunden lang tragen.	Überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste entfernen. Ausgespültes Gel nicht verschlucken.	Zahnschiene mit einer weichen Bürste und Wasser säubern.
FR	Exprimer une ligne continue de gel le long de la moitié inférieure de la joue de chaque gouttière d'alignement. Utiliser ¼ à 1/3 de la seringue par arc.	Tapoter légèrement la gouttière pour adapter les côtés aux dents. Assurez-vous que les plateaux sont bien en place et complètement engagés sur les boutons d'alignement. Porter le gel Opalescence 10% pendant 8 à 10 heures ou toute la nuit.	Retirer l'excédent de gel avec une brosse à dents souple. Ne pas avaler l'excès de gel.	Nettoyer la gouttière avec une brosse souple et de l'eau.
NL	Spuit één volle lijn gel langs de onderste helft van de wangkant van elke uitlijnbeugel. Gebruik ¼ tot 1/3 spuit per tandenboog.	Tik zachtjes op de beugel om de zijkanten aan te passen aan de tanden. Zorg ervoor dat de trays volledig op hun plaats zitten en volledig vast op de alignerknoppen staan. Laat de Opalescence 10% gel 's nachts gedurende 8-10 uur zitten.	Verwijder overtollige gel met een zachte tandenborstel. Slik gespoelde gel niet in.	Reinig de beugel met een zachte borstel en water
IT	Erogare una linea di gel continua lungo la metà inferiore lato guancia di ciascuna mascherina con allineatore. Usare da ¼ a 1/3 di siringa per. ciascuna arcata.	Battere leggermente sulla mascherina per adattare i lati ai denti. Assicurarsi chele mascherine siano completamente inserite e agganciate ai pulsanti dell'allineatore. Applicare gel opalescenza 10% per 8-10 ore durante la notte.	Rimuovere il gel in eccesso con uno spazzolino morbido. Non ingerire il gel risciacquato.	Pulire la mascherina con una spazzola morbida e acqua.
ES	Aplique una línea continua de gel a lo largo de la mitad inferior del lado de la mejilla de cada cubeta alineadora. Utilice entre ¼ y un 1/3 de la. jeringa por arco.	Golpee ligeramente la cubeta para adaptar los lados de la cubeta a los dientes. Asegúrese de que las cubetas están completamente asentadas y conectadas con los botones del alineador. Lleve el gel Opalescence al 10 % durante 8 a 10 horas o. por la noche.	Retire el exceso de gel con un cepillo de dientes blando. No ingiera el gel enjuagado.	Limpie la cubeta con un cepillo suave y agua..
PT	Esprema uma linha contínua de gel ao longo da metade inferior do lado da bochecha de cada moldeira de alinhamento. Use ¼ a 1/3 da seringa por arco.	Bata ligeiramente na moldeira para adaptar os lados aos dentes. Certifique-se de que os tabuleiros estão completamente assentes e completamente encaixados nos botões de alinhamento. Use o gel Opalescence 10% durante 8-10 horas ou durante a noite.	Remova o excesso de gel com uma escova de dentes macia. Não engula o gel removido pela água.	Limpe a moldeira com uma escova suave e água.
SV	Tryck ut en rad av gel längs den undre halvan av kindsidan i varje skena. Använd ¼ till 1/3 av sprutan per båge.	Knacka lätt på skenan för att passa in dess sidor mot tänderna. Se till att skedarna sitter väl på plats och ansluter helt till aligner-knapparna. Använd Opalescence 10 % gel i 8-10 timmar eller medan du sover.	Ta bort överskott av gel med en mjuk tandborste. Svälj inte bortsköljd gel.	Rengör brickan med en mjuk borste och vatten.
DA	Læg en kontinuerlig gelstribe langs den nedre halvdel af kindsiden af hver alignerform. Brug ¼ til 1/3 af sprøjten pr. bue.	Skub let på formen for at tilpasse siderne til tænderne. Sørg for, at bakkerne sidder helt fast og er korrekt fastgjort på justeringsknapperne. Bær Opalescence 10% gel i 8-10 timer eller natten over.	Fjern overskydende gel med en blød tandbørste. Synk ikke afskyllet gel.	Rengør formen med en blød børste og vand.
FI	Purista yksi katkeamaton rivi geeliä kunkin oikomiskojeen poskenpuolen alaosaa pitkin. Käytä ¼ - 1/3 ruiskullista per kaari.	Sovita sivut hampaisiin kiskoa kevyesti napauttamalla. Varmista, että muotit ovat kokonaan paikallaan ja täysin kiinnittyneinä oikomisnastoihin. Käytä 10-prosenttista Opalescence-geeliä 8-10 tuntia tai yön yli.	Poista ylimääräinen geeli pehmeällä hammasharjalla. Älä niele huuhdeltua geeliä.	Puhdista alusta pehmeällä harjalla ja vedellä.
EL	Εξάγετε μία συνεχή γραμμή γέλης κατά μήκος του κάτω μισού της πλευράς του μάγουλου κάθε δίσκου-νάρθηκα. Χρησιμοποιήστε το ¼ έως το 1/3 της σύριγγας ανά τόξο.	Κτυπήστε ελαφρώς τον δίσκο για να προσαρμόσετε τις πλευρές του στα δόντια. Βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι είναι σωστά τοποθετημένοι και συναρμόζουν πλήρως με τα κουμπιά ευθυγράμμισης. Εφαρμόστε τη γέλη Opalescence 10% για 8-10 ώρες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.	Αφαιρέστε τη γέλη που περισσεύει με μια μαλακή οδοντόβουρτσα. Μην καταπίνετε τη γέλη που αφαιρέθηκε.	Καθαρίστε το δίσκο με μαλακή βούρτσα και νερό.
NO	Press ut en kontinuerlig linje med gel langs den nedre halvdelen på kinnsiden av hver justerinsskinne. Bruk ¼ til 1/3 av sprøyten til hver bue.	Bank lett på skinnen for å tilpasse sidene til tennene. Pass på at brettene er riktig plassert og fullstendig tilkoblet justeringsknappene. Bruk Opalescence 10% gel i 8-10 timer eller over natten.	Fjern overflødig gel med en myk tannbørste. Ikke svelg skylt gel.	Rengjør skinne med myk børste og vann.
PL	Wycisnąć jedną ciągłą linię żelu na dolną połowę policzkowej strony nakładki wyrównującej. Użyć od ¼ do 1/3 strzykawki na łuk.	Delikatnie postukać w nakładkę, aby dostosować jej ścianki do zębów. Należy upewnić się, że łyżki są właściwie osadzone i całkowicie zablokowane na zaczepach nakładki wyrównującej. Nosić żel Opalescence 10% przez 8–10 godzin przez noc.	Usunąć nadmiar żelu miękką szczoteczką do zębów.Nie połykać spłukanego żelu.	Wyczyścić nakładkę miękką szczoteczką i wodą.
CS	Vytlačte jednu nepřetržitou linii gelu podél spodní poloviny tváře každého nosiče na rovnátka. Použijte ¼ až 1/3 stříkačky na oblouk.	Na nosič jemně poklepejte, aby jeho strany přilnuly k zubům. Zajistěte, aby podnosy byly kompletně usazeny a napojeny na zarovnávací prvky. 10% Opalescence noste po dobu 8-10 hodin přes noc.	Přebytečný gel odstraňte pomocí jemného kartáčku na zuby. Opláchnutý gel nepolykejte.	Nosič po každém použití očistěte jemným kartáčkem a vodou.
RU	Выдавите одну непрерывную линию геля вдоль нижней половины щечной стороны каждого элайнера. Используйте не более ¼ до 1/3 от объема шприца на один зубной ряд.	Кончиками пальцев прижмите капу, чтобы она плотно прилегла к зубам. Убедитесь, что капы надеты до конца и плотно прилегают к активаторам (аттачментам). Носите капу с 10-процентным гелем Opalescence в течение 8-10 часов либо на протяжении всей ночи.	Удалите избыток геля с помощью мягкой зубной щетки. Не проглатывайте воду, содержащую остатки геля.	Очистите капу прохладной водой, используя мягкую зубную щетку.
TR	Her şeffaf plağın yanak tarafının alt yarısına jeli kesintisiz bir çizgi şeklinde uygulayın. Her arkta şırınganın ¼'ü ila 1/3'ünü uygulayın.	Plakların dişe uyum sağlaması için plağa hafifçe vurun. Plakların tam oturduğundan ve hizalayıcı butonlara tamamen bağlandığından emin olun. Opalescence %10, 8–10 saat veya gece boyu kullanılmalıdır.	Fazla jeli yumuşak bir diş fırçasıyla çıkarın. Yıkanan jeli yutmayın.	Plağı yumuşak fırça ve suyla yıkayın.
AR	اعصر خط واحد متواصل من الجل على طول النصف السفلي من جانب الخد لكل طبق من طبقات تقويم الأسنان. استخدم نصف حقنة جل إلى ربع والكثير من الجرعة لكل قوس.	اضغط برفق على الطبق لتكييف الجوانب مع الأسنان. ضع جل Opalescence 10٪ لمدة تتراوح بين 8 و10 ساعات أو طوال الليل. تأكد من تثبيت الطبق بشكل صحيح تمامًا وتثبيته بمحاذاة الأسنان.	قم بإزالة الجل الزائد بفرشاة أسنان ناعمة. لا تبتلع الجل المنتج عن غسل الأسنان بالماء.	نظف الطبق بالماء باستخدام فرشاة ناعمة.
TH	ปล่อยเจลเป็นเส้นต่อเนื่องหนึ่งเส้นตามแนวครึ่งล่างของแก้มด้านข้างของถาดจัดฟันแต่ละแถว ใช้ปริมาณขนาด 1/4 ถึง 1/3 ของกระบอกฉีดต่อแนวเส้นโค้ง	แตะถาดเบา ๆ เพื่อปรับด้านข้างๆ กับแนวฟัน ให้เจล แตะถาดเบา ๆ เพื่อปรับด้านข้างๆ กับแนวฟัน ให้เจล Opalescence 10% นาน 8-10 ชั่วโมงหรือข้ามคืน	ขจัดเจลส่วนเกินออกด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม อย่ากลืนเจลที่ถูกล้างออก	ทำความสะอาดถาดฟอกสีฟันด้วยแปรงขนอ่อนและน้ำ
KO	각 교정기 트레이의 볼쪽 하단을 따라 젤을 하나의 연속된 라인으로 짜주십시오. 긱 치열궁 마다 주사기 ¼ 에서 1/3 용량을 사용하십시오.	트레이를 가볍게 두드려 치아 옆면까지 맞추어 주십시오. 트레이가 올바른 위치에 제대로 장착되어 얼라이너 버튼과 완전히 맞물려 있는지 확인해주십시오. Opalescence 10% 겔을 8-10시간 또는 하룻밤 동안 착용하십시오.	부드러운 칫솔을 사용하여 남은 겔을 제거하십시오. 헹구어낸 겔을 삼키지 마십시오.	부드러운 솔과 물로 트레이를 세척합니다.
ZH	沿着每个对齐器牙托的脸颊侧下半部分挤出一条连续的凝胶线。每个拱形使用注射器的 ¼ 至 1/3 份量。	轻轻敲打牙托，以使侧面适应牙齿。确保牙托完全就位并完全接合到对齐器按键上。佩戴 Opalescence 10% 凝胶 8-10 小时或整夜	用软牙刷去除多余的凝胶。切勿吞咽冲洗的凝胶。	用软刷和水清洁牙托。

EN - For professional use only
DE - Nur zur Verwendung durch Sachkundige
FR - Destiné à un usage professionnel uniquement
NL - Alleen voor professioneel gebruik
IT - Esclusivamente ad uso professionale
ES - Sólo para uso profesional
PT - Apenas para uso profissional
SV - Enbart för yrkesmässig användning
DA - Kun til professionel brug
FI - Vain ammattikäyttöön
EL - Για επαγγελματική χρήση μόνο
NO - Kun for profesjonell bruk
PL - Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
CS - Pouze pro odborné použití
RU - Только для профессионального применения
TR - Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir
AR - للاستخدام المهني فقط
TH - สำหรับผู้เชี่ยวชาญใช้เท่านั้น
KO - 전문가 전용
ZH - 仅用于专业用途

EN - Health hazard
DE - Gesundheitsgefahr
FR - Dangereux por la santé
NL - Gevaar voor de gezondheid
IT - Pericolo per la salute
ES - Peligro para la salud
PT - Riscos à saúde
SV - Hälsofara
DA - Sundhedsfarlig
FI - Terveysvaara
EL - Κινδυνος για την υγεία
NO - Helsefare
PL - Zagrożenie dla zdrowia
CS - Zdravotní riziko
RU - Опасно для здоровья
TR - Sağlık için tehlikeli
AR - خطر على الصحة
TH - อันตรายต่อสุขภาพ
KO - 건강유해물
ZH - 健康危害

EN - Do not re-use to avoid cross contamination
DE - Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen
FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada
PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
SV - För undvikande av korskontamination, återanvänd inte
DA - Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
FI - Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi
EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση
NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning
PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia
CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci
RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения
TR - Çapraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın
AR - لا تعيد استخدامه لتجنب التلوث المتبادل
TH - ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม
KO - 교차 오염 방지를 위해 재사용하지 말 것
ZH - 切勿再使用，以免交叉感染

EN - Keep out of reach of children
DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
FR - Tenir hors de la portée des enfants
NL - Buiten bereik van kinderen houden
IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini
ES - Mantenga alejado del alcance de los niños
PT - Mantenha o produto fora do alcance de crianças
SV - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn
DA - Opbevares utilgængeligt for børn
FI - Pidä poissa lasten ulottuvilta
EL - Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά
NO - Holdes utilgjengelig for barn
PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
CS - Ukládejte mimo dosah dětí
RU - Хранить в недоступном для детей месте
TR - Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin
AR - احفظه بعيدا عن متناول الأطفال
TH - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
KO - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둘 것
ZH - 置于儿童不能触及之处



EN - Refrigerate
DE - Kühlen
FR - Réfrigérer
NL - In de koelkast bewaren
IT - Conservare in frigorifero
ES - Refrigere
PT - Refrigerar
SV - Förvaras i kylskåp
DA - Opbevares i køleskab
FI - Säilytä jääkaapissa
EL - Διατηρήστε το στο ψυγείο
NO - Kjøl ned
PL - Przechowywać w lodówce
CS - Zmrazte
RU - Хранить в холодильнике
TR - Soğutun
AR - قم بوضعه في الثلاجة
TH - เก็บที่อุณหภูมิเย็น
KO - 냉장보관
ZH - 冷藏

EN - See Instructions
DE - Siehe Anleitung
FR - Cf. instructions
NL - Zie gebruiksaanwijzing
IT - Vedere le istruzioni
ES - Vea las Instrucciones
PT - Veja as instruções
SV - Se anvisningar
DA - Se brugsanvisningen
FI - Lue käyttöohjeet
EL - Δείτε τις οδηγίες
NO - Se instruksjoner
PL - Patrz: instrukcje
CS - Viz pokyny
RU - См. инструкцию
TR - Talimatlara bakın
AR - انظر التعليمات
TH - ดูขั้นตอนการใช้
KO - 설명서 참고
ZH - 参阅说明

EN - Keep away from heat/sunlight
DE - Von Hitze/Sonneneinstrahlung fernhalten
FR - Conserver à l'abri de la chaleur/lumière du soleil
NL - Uit de buurt van warmte/zonlicht bewaren
IT - Tenere lontano da fonti di calore/luce del sole
ES - Mantenga alejado del calor/luz solar
PT - Mantenha distância do calor/luz solar
SV - Skyddas från värme/solljus
DA - Må ikke udsættes for varme/sollys
FI - Suojattava kuumuudelta/auringonvalolta
EL - Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα/ηλιακό φως
NO - Hold borte fra varme/solskinn
PL - Przechowywać z dala od ciepła/promieniowania słonecznego
CS - Chraňte před teplem a sluncem
RU - Беречь от воздействия высоких температур и солнечного света
TR - Isıdan/güneş ışığından uzak tutun
AR - احفظه بعيدا عن متناول الأطفال
TH - เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
KO - 열/햇빛으로부터 차단
ZH - 避免热源/日晒

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

For an SDS of this product, please see: www.ultradent.com

Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Xylitol, Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

EN - Tooth Whitening System
DE - System zur Zahnaufhellung
FR - Système pour blanchiment des dents
NL - Tandbleeksysteem
IT - Sistema per lo sbiancamento dei denti
ES - Sistema de Blanqueamiento Dental
PT - Sistema de branqueamento dental
SV - Tandblekningssystem
DA - Tandblegningssystem
FI - Hampaiden valkaisujärjestelmä
EL - Σύστημα Λεύκανσης Δοντιών
NO - Tannblekingssystem
PL - System wybielania zębów
CS - Systémy bělení zubů
RU - Система для отбеливания зубов
TR - Diş Beyazlatma Sistemi
AR - نظام تبييض الأسنان
TH - ระบบฟอกสีฟัน
KO - 치아미백시스템
ZH - 牙齿 漂白 系统

Opalescence™
tooth whitening systems

FOR ALIGNERS



© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. Made in USA

Manufactured by Ultradent Products, Inc. 505 West Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095 1008787AR02 092820